

Aus dem Pharmakologischen Institut der Westfälischen  
Wilhelms-Universität, Münster / Westf.  
Direktor: Prof. Dr. med et phil. H. Freund

---

# Ueber das Zusammenwirken von Digilanid und Coffein auf den Sauerstoffverbrauch im überlebenden Gewebe

## Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der zahnmedizinischen Doktorwürde

der

Hohen medizinischen Fakultät der  
Westfälischen Wilhelms-Universität  
Münster / Westf.

Vorgelegt von

Theodor Meyer

(Zahnarzt)

aus Langenberg / Westf.

---

Buch- und Kunstdruckerei



Wilh. Postberg, Bottrop a. V.

1 9 3 5

**Dekan: Prof. Dr. Klinge**

**Referent: Privatdozent Dr. med. et phil. W. Haarmann**

**Korreferent: Prof. Dr. med. et phil. H. Freund**



**Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der  
Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster i. Westf.**

*Meiner lieben Mutter  
in Dankbarkeit gewidmet.*



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41555428\\_0147](https://archive.org/details/IA41555428_0147)

Die in der Herztherapie verwendeten Digitalispräparate stammten früher meist aus dem roten Fingerhut, *Digitalis purpurea*. In neuerer Zeit fand auch *Digitalis lanata* in der Therapie Eingang. Die beiden Digitalisarten enthalten nach den Untersuchungen von Mannich, Mohs und Mauß<sup>1)</sup>, Smith<sup>2)</sup>, ferner von Stoll und Kreis<sup>3)</sup> voneinander verschiedene herzwirksame Glukoside. Von den *Purpurea*-Glukosiden sind bekannt: 1. das Digitoxin, 2. das Gitoxin-Bigitalin, 3. das Gitalin und 4. das Digitalin. In der *Digitalis lanata* findet man gleichfalls Digitoxin und Gitoxin, nicht aber das Gitalin, sondern statt dessen das Digoxin. Es wurde früher allgemein angenommen, daß diese Glukoside in dieser Form schon in der Droge enthalten sind. Stoll und Kreis<sup>3)</sup> konnten jedoch nachweisen, daß die als genuine Digitalis-Glukoside angesehenen Verbindungen durch enzymatischen Abbau von höheren molekularen Glukosiden entstehen, die bei diesem Vorgang Glukose und ferner Acetylgruppen abspalten. Stoll und Mitarbeiter gelang es, durch eine schonende und enzymhemmende Extraktionsmethode aus der *Digitalis lanata* den Hauptteil des gesamten Glukosidgehaltes der Droge in kristallisierter Form zu gewinnen. Es handelt sich hier um ein Glukosid-Gemisch, das sich physikalisch in die isomorphen Komponenten trennen läßt. Es wurden drei neue einheitliche Glukoside hergestellt, die die Bezeichnung A, B und C erhielten. Die einzelnen Digilanide kristallisieren sich genau gleich. Es handelt sich hier also um isomorphe Kristallformen, die darauf hinweisen, daß die Verbindungen in ihrer Struktur größte Ähnlichkeit aufweisen. Durch schonende Aufspaltung entstehen aus den Digilaniden die bereits früher bekannten Digitalis-Glukoside: Digitoxin, Gitoxin und Digoxin, die bei weiterer Aufspaltung in ihre Aglukone Digitoxigenin, Gitoxylene und Digoxxygenin übergehen. Die Digilanide sind die zuckerreichsten bisher bekannten Herzglukoside. Sie enthalten vier Zucker-Moleküle. Das Digilanid-Gemisch A, B und C kommt unter dem Namen Digilanid in den Handel und wird von der Firma Sandoz, Nürnberg, hergestellt. Das Digilanid wird

---

1) Mannich, Mohs und Mauß: Arch. d. Pharmazie 1930, H. 7.

2) Smith: Journ. chem. Soc. London 1930, 508.

3) Stoll und Kreis: Münch. med. Wo. 80, 723, 1933.

vom pharmakologischen Standpunkt aus als „kristallisiertes In-fus“ bezeichnet und zeichnet sich durch Reinheit, Haltbarkeit und Konstanz der Wirkung aus. Da es sich um ein einheitliches Gemisch handelt, so erfolgt die pharmakologische Einstellung nicht mittels Tierversuches, sondern mit der analytischen Wage, was gegenüber der Unsicherheit aller Tierversuche einen großen Vorteil bedeutet.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, den Einfluß des Digilanids auf eine Reihe von biologisch wichtigen Oxydationsvorgängen in der Zelle zu untersuchen. Für die Beurteilung von Herzmitteln ist hier besonders das Verhalten des Glukoseabbaus durch Herzmuskel von Bedeutung, weil durch Verbrennung der Glukose der Herzmuskel in erster Linie seinen Energiebedarf deckt. Da sich aber in Arbeiten aus dem hiesigen Institut gezeigt hat, daß auch die Wirkung von Herzmitteln in allen übrigen Organen nachweisbar ist, an Organen, die nicht zum eigentlichen Angriffspunkt der Herzmittel gehören, so wurde auch die Einwirkung durch Digilanid auf den Sauerstoffverbrauch von Skelettmuskulgewebe und von Leberwebe geprüft.

Aus einer Reihe von Arbeiten aus dem hiesigen Institut geht hervor, daß die Stoffwechselwirkung der herzwirksamen Glukoside durch Zusatz von Coffein stark verschoben wird (vgl. die Arbeiten von Schäfer<sup>4)</sup>, Dopmeyer<sup>5)</sup>, Krüger<sup>6)</sup>, Frye<sup>7)</sup>, Schmeink<sup>8)</sup>). Je nach der angewandten Coffeinkonzentration kann die Glukosidwirkung gesteigert oder aufgehoben werden oder in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Es ergibt sich zumeist eine Gesamtwirkung, die sich nicht aus der reinen Summierung der Einzelwirkung voraussehen läßt. Oft erfolgt eine starke Anregung von Stoffwechselleistungen durch die Kombination eines Glukosids mit Coffein, selbst in Konzentrationen, in denen beide Gifte für sich unwirksam sind. Es war daher von großem theoretischen wie auch praktischem Interesse, an der Sauerstoffzehrung von überlebendem Gewebe die maximal fördernde Kombination Coffein und Digilanid herauszufinden.

Die Versuchsanordnung war die im hiesigen Institut übliche. Es wurde mit Gewebeprei gearbeitet, die Sauerstoffaufnahme des Gewebes wurde mit der bekannten Warburg'schen Apparatur bestimmt.

---

<sup>4)</sup> Schäfer: Inaugural-Disertation, Münster 1934.

<sup>5)</sup> Dopmeyer: ebenda 1934.

<sup>6)</sup> Krüger: ebenda (im Druck).

<sup>7)</sup> Frye: ebenda (im Druck).

<sup>8)</sup> Schmeink: ebenda 1934.

## Versuchsserie I.

Der Kohlenhydratabbau durch Herzmuskel verläuft grundsätzlich anders wie im Skelettmuskel. Dieses unterschiedliche Verhalten tritt sowohl beim anaeroben wie auch oxydativen Kohlenhydratabbau in Erscheinung. Unter anaeroben Bedingungen führt Zusatz von Glukose zum Skelettmuskel zu einer nur geringfügigen Steigerung der Milchsäurebildung, während der Herzmuskel Glukose leicht in Milchsäure umwandelt (vgl. Haarmann<sup>9)</sup>). Vergleicht man den Zuckerschwund unter anoxybiontischen und aeroben Bedingungen, so zeigt sich nach bisher noch unveröffentlichten Versuchen von Haarmann mit Brink, daß im Skelettmuskel bei Sauerstoffabschluß größere Mengen Zucker verschwinden als bei Gegenwart von Sauerstoff. Herzmuskel verhält sich umgekehrt. Hier verschwinden größere Mengen Glukose oxydativ als anaerob. Der oxydative Glukoseabbau überwiegt beim Herzen, während er beim Skelettmuskel gegenüber dem anaeroben Abbau zurücktritt. Die Oxydation der Glukose durch Herzmuskel dürfte mithin der hauptenergie-liefernde Vorgang sein. Bei der Untersuchung von Herzmitteln ist also ihr Einfluß auf die Glukoseoxydation von besonderer Bedeutung.

Aus den Versuchen der Tabelle I geht hervor, daß das Digilanol auf die Glukoseverbrennung fast ohne erkennbaren Einfluß ist. In stärksten Verdünnungen macht sich eine geringfügige Hemmung bemerkbar. Auch die Coffeinwirkung (Tab. II) ist nicht sehr stark. Die Herzen von verschiedenen Tieren der gleichen Art (Rind) reagieren auf Coffein nicht vollkommen gleichmäßig. In Versuch I tritt in starken Verdünnungen eine geringfügige Hemmung auf und in hohen Konzentrationen eine leichte Förderung, in Versuch 2 nur Förderungswirkung.

Bringt man beide Gifte gleichzeitig zur Anwendung, so zeigt sich, daß geringe Gaben von Coffein ( $1 \cdot 10^{-7}$ ), die für sich allein den Sauerstoffverbrauch kaum beeinflussen, beim Zusammenwirken mit ansteigenden Digilanol-Konzentrationen den Sauerstoffverbrauch in der Weise abändern, daß mehr Sauerstoff aufgenommen wird als bei einer Addition der Einzelwirkungen gefordert werden muß. Dieses Verhalten tritt nur bei der Kombination von Coffein  $1 \cdot 10^{-7}$  mit der Digilanolkonzentration  $2 \cdot 10^{-9}$  und  $2 \cdot 10^{-8}$  in Erscheinung. Besonders die Kombination  $1 \cdot 10^{-7}$

---

<sup>9)</sup> W. Haarmann: Biochem. Zeitschr. 255, 103, 1932.

Tabelle I.

## Herz: Glukosezusatz:

| Versuchsanordnung                 | cmm O <sub>2</sub> |     | O <sub>2</sub> : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|-----------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                   |                    |     | gefunden                               |     | theoretisch |     |
|                                   | 1                  | 2   | 1                                      | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle                         | 418                | 346 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-10</sup>     | 392                | 326 | 94                                     | 94  |             |     |
| " 2.10 <sup>-9</sup>              | 396                | 340 | 95                                     | 98  |             |     |
| " 2.10 <sup>-8</sup>              | 402                | 338 | 96                                     | 98  |             |     |
| " 2.10 <sup>-7</sup>              | 399                | 354 | 95                                     | 102 |             |     |
| " 2.10 <sup>-6</sup>              | 414                | 356 | 99                                     | 103 |             |     |
| Kontrolle                         | 328                | 344 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-7</sup>        | 348                | 352 | 106                                    | 102 |             |     |
| " + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 320                | 326 | 98                                     | 95  | 100         | 98  |
| " + " 2.10 <sup>-9</sup>          | 360                | 375 | 110                                    | 109 | 101         | 100 |
| " + " 2.10 <sup>-8</sup>          | 430                | 462 | 131                                    | 134 | 101         | 100 |
| " + " 2.10 <sup>-7</sup>          | 336                | 342 | 102                                    | 99  | 101         | 102 |
| " + " 2.10 <sup>-6</sup>          | 340                | 344 | 103                                    | 100 | 103         | 103 |
| Kontrolle                         | 449                | 454 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-4</sup>        | 448                | 470 | 100                                    | 104 |             |     |
| " + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 391                | 393 | 87                                     | 87  | 97          | 99  |
| " + " 2.10 <sup>-9</sup>          | 396                | 407 | 88                                     | 90  | 98          | 100 |
| " + " 2.10 <sup>-8</sup>          | 456                | 474 | 101                                    | 105 | 98          | 100 |
| " + " 2.10 <sup>-7</sup>          | 382                | 384 | 85                                     | 85  | 98          | 103 |
| " + " 2.10 <sup>-6</sup>          | 362                | 400 | 81                                     | 88  | 99          | 104 |

Coffein und 2.10<sup>-8</sup> Digilanid steigert die Glukoseverbrennung sehr erheblich. Während das Coffein in Versuch I die Glukoseverbrennung um 6 % steigert und die Digilanidkonzentration 2.10<sup>-8</sup> um 4% hemmt, wird beim Zusammenwirken der beiden Stoffe die Glukoseoxydation um 31% gefördert, während man bei reiner additiver Wirkung einen Sauerstoffverbrauch erwarten sollte, der dem Kontrollversuch ohne Zusatz der beiden Gifte entspricht. Dieses optimal fördernde Konzentrationsgemisch entspricht annähernd den Konzentrationen, wie sie sich bei der therapeutischen Darreichung der beiden Gifte unter der Annahme der gleichmä-

Tabelle II.

## Herz: Glukosezusatz:

| Versuchsanordnung              | cmm O <sub>2</sub> |     | O <sub>2</sub> : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|--------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                |                    |     | gefunden                               |     | theoretisch |     |
|                                | 1                  | 2   | 1                                      | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle                      | 378                | 320 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-8</sup>     | 350                | 342 | 93                                     | 107 |             |     |
| " 1.10 <sup>-7</sup>           | 361                | 346 | 96                                     | 108 |             |     |
| " 1.10 <sup>-6</sup>           | 372                | 360 | 98                                     | 112 |             |     |
| " 1.10 <sup>-5</sup>           | 378                | 330 | 100                                    | 103 |             |     |
| " 1.10 <sup>-4</sup>           | 388                | 345 | 103                                    | 108 |             |     |
| Kontrolle                      | 410                | 420 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-10</sup>  | 393                | 400 | 96                                     | 95  |             |     |
| " + Coffein 1.10 <sup>-8</sup> | 388                | 414 | 95                                     | 99  | 95          | 101 |
| " + " 1.10 <sup>-7</sup>       | 408                | 428 | 100                                    | 102 | 96          | 102 |
| " + " 1.10 <sup>-6</sup>       | 478                | 484 | 116                                    | 115 | 97          | 104 |
| " + " 1.10 <sup>-5</sup>       | 422                | 428 | 103                                    | 102 | 98          | 99  |
| " + " 1.10 <sup>-4</sup>       | 436                | 468 | 106                                    | 112 | 100         | 102 |
| Kontrolle                      | 410                | 384 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-6</sup>   | 410                | 386 | 100                                    | 100 |             |     |
| " + Coffein 1.10 <sup>-8</sup> | 388                | 378 | 95                                     | 98  | 97          | 104 |
| " + " 1.10 <sup>-7</sup>       | 444                | 440 | 108                                    | 115 | 98          | 104 |
| " + " 1.10 <sup>-6</sup>       | 472                | 454 | 115                                    | 118 | 99          | 106 |
| " + " 1.10 <sup>-5</sup>       | 426                | 402 | 104                                    | 105 | 100         | 102 |
| " + " 1.10 <sup>-4</sup>       | 435                | 436 | 106                                    | 113 | 102         | 104 |

bigen Verteilung im Organismus einstellen. 0,5 mg Scillaren bzw. 0,1 g Coffein würden eine Konzentration bei 50 kg Weichteilen 1.10<sup>-8</sup> Digilanid bzw. 2.10<sup>-6</sup> Coffein ergeben. Das sind aber gerade die Konzentrationen, bei deren Kombination wir die stärkste Förderung der Glukoseverbrennung im Herzmuskel sehen.

Hohe Coffeinkonzentrationen, die die Sauerstoffatmung in unseren Versuchen gleichfalls wie auch in niedrigen Konzentrationen unbeeinflusst lassen, wirken in der Kombination mit Digilanid umgekehrt wie niedrige Coffeinkonzentrationen. Die Sauerstoffaufnahme wird verschlechtert. Die theoretisch errech-

neten Mittelwerte bei additiver Wirkung der Gifte werden unterschritten. Sowohl niedrige wie auch hohe Konzentrationen wirken in Verbindung mit hohen Konzentrationen verschlechternd auf die Glukoseverbrennung im Herzmuskel ein. Lediglich bei einer Digilanidkonzentration von  $2.10^{-8}$  kommt es zu keiner Verschlechterung der Glukoseverbrennung. Hier ist die Wirkung der beiden Mittel rein additiv.

Läßt man schwache Gaben von Digilanid ( $2.10^{-10}$ ) mit wechselnden Coffeinkonzentrationen zusammenwirken, so zeigt sich, daß durch das Coffein die Sauerstoffzehrung verbessert wird. Die günstigsten Einwirkungen sehen wir bei der Konzentration  $2.10^{-10}$  Digilanid und  $1.10^{-6}$  Coffein. Die Steigerungen der Sauerstoffaufnahme gegenüber dem Kontrollversuch betragen 16 % im Versuch I und 15 % im Versuch II, sie bleiben also erheblich hinter den Sauerstoffwerten zurück, wie sie bei der Kombination von  $1.10^{-7}$  Coffein und  $2.10^{-8}$  Digilanid in den Versuchen der Tabelle I gefunden werden.

Hohe Digilanidkonzentrationen, die in den Versuchen in der Tabelle II die Glukoseverbrennung unbeeinflußt lassen, rufen in Verbindung mit Coffein eine Steigerung der Sauerstoffzehrung hervor, die annähernd den Sauerstoffwerten entspricht, wie sie unter den gleichen Bedingungen mit niedrigen Digilanidkonzentrationen auftreten. Die Kombination  $1.10^{-6}$  Coffein und  $2.10^{-6}$  Digilanid regen die Sauerstoffzehrung besonders stark an (15 % bzw. 18 %). Der theoretische Mittelwert für die Sauerstoffaufnahme liegt in allen Fällen unter den Werten, wie sie bei kombinierter Darreichung der beiden Gifte gefunden werden.

## Versuchsserie II.

Die folgenden Versuche haben das Verhalten der Sauerstoffzehrung im Skelettmuskelgewebe bei Zusatz der beiden Herzmittel zum Gegenstand.

Aus Tabelle III geht hervor, daß das Digilanid nur in höheren Konzentrationen die Muskelatmung anregt. Starke Verdünnungen sind wie in Versuch I wirkungslos oder aber führen wie in Versuch II zu einer Hemmung der Sauerstoffzehrung. Mit ansteigender Digilanidkonzentration nehmen die Sauerstoffwerte zu und erreichen in Versuch I bei der Konzentration  $2.10^{-6}$  ihr Maximum, in Versuch II bei  $1.10^{-7}$ . Die oxydationssteigernde Wirkung beträgt hier 20 % bzw. 12 %. Wie das Digilanid, so steigert auch das Coffein in höheren Konzentrationen die Sauerstoffatmung vom Skelettmuskel. Das Maximum der Wirkung

Tabelle III.

Muskel: ohne Zusatz.

| Versuchsanordnung                 | cmm O <sub>2</sub> |     | O <sub>2</sub> : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|-----------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                   |                    |     | gefunden                               |     | theoretisch |     |
|                                   | 1                  | 2   | 1                                      | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle                         | 270                | 308 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-10</sup>     | 278                | 262 | 103                                    | 85  |             |     |
| „ 2.10 <sup>-9</sup>              | 287                | 278 | 106                                    | 90  |             |     |
| „ 2.10 <sup>-8</sup>              | 300                | 312 | 111                                    | 102 |             |     |
| „ 2.10 <sup>-7</sup>              | 315                | 346 | 117                                    | 112 |             |     |
| „ 2.10 <sup>-6</sup>              | 324                | 278 | 120                                    | 90  |             |     |
| Kontrolle                         | 314                | 418 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-7</sup>        | 240                | 404 | 77                                     | 97  |             |     |
| „ + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 238                | 366 | 76                                     | 88  | 90          | 91  |
| „ + „ 2.10 <sup>-9</sup>          | 270                | 424 | 86                                     | 101 | 92          | 94  |
| „ + „ 2.10 <sup>-8</sup>          | 300                | 430 | 96                                     | 103 | 94          | 99  |
| „ + „ 2.10 <sup>-7</sup>          | 332                | 444 | 106                                    | 106 | 97          | 105 |
| „ + „ 2.10 <sup>-6</sup>          | 342                | 366 | 109                                    | 88  | 99          | 94  |
| Kontrolle                         | 322                | 340 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-4</sup>        | 318                | 368 | 99                                     | 108 |             |     |
| „ + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 326                | 334 | 102                                    | 98  | 101         | 97  |
| „ + „ 2.10 <sup>-9</sup>          | 344                | 358 | 107                                    | 105 | 103         | 99  |
| „ + „ 2.10 <sup>-8</sup>          | 344                | 362 | 107                                    | 106 | 105         | 105 |
| „ + „ 2.10 <sup>-7</sup>          | 361                | 370 | 112                                    | 109 | 108         | 110 |
| „ + „ 2.10 <sup>-6</sup>          | 376                | 372 | 117                                    | 109 | 111         | 99  |

liegt hier einheitlich bei der Konzentration 1.10<sup>-4</sup> mit einer Steigerung von 27 bzw. 14 %. Die oxydationssteigernde Wirkung der beiden Gifte, die beim Herzmuskel nur eben angedeutet ist, ist beim Skelettmuskel sehr ausgesprochen.

Bei gleichzeitiger Einwirkung von niedrigen Coffeinkonzentrationen mit Digilanid tritt eine Sauerstoffzehrung auf, die allgemein höher ist als in der Coffeinwirkung allein. Bringt man jedoch hohe Coffeinkonzentrationen mit wechselnden Digilanidkonzentrationen zusammen, so ergibt sich eine Gesamtwirkung,

die annähernd einer reinen additiven Wirkung der beiden Gifte entspricht.

Beim Glukoseabbau durch Herzmuskel (Tab. I) ergab sich eine maximale Wirkung auf die Sauerstoffzehrung bei der Kombination von  $1.10^{-7}$  Coffein und  $1.10^{-8}$  Digilanid (+ 31 bzw. 34 %) gegenüber + 1% bzw.  $\pm 0\%$  bei der errechneten rein additiven Wirkung. Im Skelettmuskel dagegen tritt unter den gleichen Bedingungen eine rein additive Wirkung ein. Der Skelettmuskel weicht also in seiner Giftempfindlichkeit weitgehend vom Herzmuskel ab. Bem Skelettmuskel sehen wir vielmehr die stärksten

Tabelle IV.

Muskel : ohne Zusatz.

| Versuchsanordnung       | cmm $O_2$ |     | $O_2$ : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|-------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----|-------------|-----|
|                         |           |     | gefunden                      |     | theoretisch |     |
|                         | 1         | 2   | 1                             | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle               | 250       | 340 | 100                           | 100 |             |     |
| Coffein $1.10^{-8}$     | 248       | 350 | 99                            | 103 |             |     |
| „ $1.10^{-7}$           | 252       | 342 | 101                           | 100 |             |     |
| „ $1.10^{-6}$           | 284       | 354 | 109                           | 104 |             |     |
| „ $1.10^{-5}$           | 296       | 376 | 118                           | 111 |             |     |
| „ $1.10^{-4}$           | 318       | 388 | 127                           | 114 |             |     |
| Kontrolle               | 262       | 316 | 100                           | 100 |             |     |
| Digilanid $2.10^{-10}$  | 224       | 264 | 86                            | 84  |             |     |
| „ + Coffein $1.10^{-8}$ | 238       | 304 | 91                            | 96  | 93          | 94  |
| „ + „ $1.10^{-7}$       | 240       | 310 | 92                            | 98  | 94          | 92  |
| „ + „ $1.10^{-6}$       | 312       | 360 | 119                           | 114 | 98          | 94  |
| „ + „ $1.10^{-5}$       | 278       | 322 | 106                           | 102 | 107         | 98  |
| „ + „ $1.10^{-4}$       | 236       | 274 | 90                            | 87  | 107         | 99  |
| Kontrolle               | 226       | 332 | 100                           | 100 |             |     |
| Digilanid $2.10^{-6}$   | 230       | 346 | 102                           | 104 |             |     |
| „ + Coffein $1.10^{-8}$ | 254       | 382 | 112                           | 115 | 100         | 104 |
| „ + „ $1.10^{-7}$       | 313       | 440 | 139                           | 133 | 102         | 102 |
| „ + „ $1.10^{-6}$       | 296       | 452 | 132                           | 136 | 106         | 104 |
| „ + „ $1.10^{-5}$       | 252       | 398 | 112                           | 120 | 110         | 108 |
| „ + „ $1.10^{-4}$       | 220       | 366 | 97                            | 110 | 115         | 109 |

Ausschläge bei der Kombination von hohen Digilanidkonzentrationen mit Coffein. Das Maximum der Wirkung tritt hier (Tabelle IV) nach Zusatz  $1.10^{-7}$  Coffein in Versuch I bzw.  $1.10^{-6}$  Coffein in Versuch II zu einer Digilanidkonzentration von  $2.10^{-6}$  auf. Die Oxidationsvorgänge im Skelettmuskel sind hier um 39 % bzw. 36 % gesteigert. Bei rein additiver Wirkung hätte man nur 6 bzw. 4 % fordern müssen. Wesentlich geringer sind die Ausschläge, wenn man niedrige Digilanidgabe mit Coffein kombiniert. Bei niedrigen Coffeindosen ergibt sich eine additive Wirkung, bei mittleren Coffeinkonzentrationen ( $1.10^{-6}$ ) eine Steigerung der Sauerstoffaufnahme über den theoretischen Mittelwert, bei hohen Coffeingaben dagegen eine starke Verminderung. Die Herzmuskulatur verhält sich auch hier umgekehrt.

### Versuchsserie III.

Mißt man den Sauerstoffverbrauch bei Glykogenzusatz, so zeigt sich, daß die Giftwirkung abgeändert wird. Das Digilanid hemmt in starken Verdünnungen den Sauerstoffverbrauch bei Zusatz von Glykogen (Tabelle V) und führt in höheren Konzentrationen zu einer leichten Steigerung. Das Coffein ist in starken Verdünnungen (Tabelle VI) nahezu wirkungslos und steigert besonders in höheren Konzentrationen den Glykogenabbau. Die Ausschläge sind annähernd von der gleichen Größenordnung wie im Skelettmuskel ohne Zusatz von Glykogen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Coffein und Digilanid, tritt in allen Fällen eine Gesamtwirkung auf den Sauerstoffverbrauch auf, die größer ist als der reinen Addition entspricht. Die höchsten Sauerstoffwerte treten auf bei der Kombination von  $1.10^{-4}$  Coffein und  $2.10^{-8}$  Digilanid (Vers. 1, Tab. V). Die Sauerstoffaufnahme beträgt hier + 33 % gegenüber 37 % im Kontrollversuch. Die Muskeln von verschiedenen Tieren weichen in ihrer Giftempfindlichkeit, wie die Versuche zeigen, stark voneinander ab. Auch bei gleichzeitiger Anwendung von einer Coffeinkonzentration  $1.10^{-6}$  sowohl mit hohen wie mit niedrigen Digilanidkonzentrationen ist, wie aus Tabelle VI hervorgeht, der Sauerstoffverbrauch erheblich gesteigert und zwar um annähernd gleiche Beträge. Beim Herzmuskel wird im Gegensatz zum Skelettmuskel bei gleichbleibenden hohen Coffeinkonzentrationen der Sauerstoffverbrauch durch Digilanid gesenkt, während wir beim Skelettmuskel nach Glykogenzusatz unter den gleichen Bedingungen hohe Sauerstoffwerte beobachten (vgl. Tab. I und V).

Tabelle V.

## Muskel : Glykogenzusatz.

| Versuchsanordnung                 | cmm O <sub>2</sub> |     | O <sub>2</sub> : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|-----------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                   |                    |     | gefunden                               |     | theoretisch |     |
|                                   | 1                  | 2   | 1                                      | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle                         | 294                | 332 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-10</sup>     | 262                | 308 | 89                                     | 93  |             |     |
| " 2.10 <sup>-9</sup>              | 265                | 324 | 90                                     | 98  |             |     |
| " 2.10 <sup>-8</sup>              | 296                | 340 | 97                                     | 103 |             |     |
| " 2.10 <sup>-7</sup>              | 300                | 344 | 102                                    | 104 |             |     |
| " 2.10 <sup>-6</sup>              | 302                | 356 | 103                                    | 107 |             |     |
| Kontrolle                         | 314                | 270 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-7</sup>        | 268                | 254 | 86                                     | 94  |             |     |
| " + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 262                | 264 | 84                                     | 98  | 88          | 94  |
| " + " 2.10 <sup>-9</sup>          | 292                | 371 | 93                                     | 137 | 88          | 96  |
| " + " 2.10 <sup>-8</sup>          | 360                | 300 | 115                                    | 111 | 92          | 99  |
| " + " 2.10 <sup>-7</sup>          | 308                | 290 | 98                                     | 107 | 94          | 99  |
| " + " 2.10 <sup>-6</sup>          | 322                | 250 | 103                                    | 93  | 95          | 101 |
| Kontrolle                         | 272                | 256 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-7</sup>        | 268                | 260 | 99                                     | 102 |             |     |
| " + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 275                | 268 | 101                                    | 105 | 94          | 98  |
| " + " 2.10 <sup>-9</sup>          | 335                | 274 | 123                                    | 107 | 95          | 100 |
| " + " 2.10 <sup>-8</sup>          | 361                | 286 | 133                                    | 112 | 98          | 103 |
| " + " 2.10 <sup>-7</sup>          | 297                | 292 | 109                                    | 114 | 101         | 103 |
| " + " 2.10 <sup>-6</sup>          | 293                | 318 | 108                                    | 124 | 101         | 105 |

## Versuchsserie IV.

Die Giftempfindlichkeit der einzelnen Organe des Körpers ist verschieden. Das zeigt sich sowohl an den Oxydationsvorgängen wie auch an den Dehydrierungen und beruht darauf, daß der Gehalt an Fermenten und auch an Nährstoffen in den einzelnen Organen stark abweicht. Es werden z. B. die Kohlenhydrate im Skelett- und Herzmuskel im großen Umfang verbrannt, nicht aber im Lebergewebe. Das Glykogen wird hier zwar zu Glukose abgebaut, diese aber kaum oxydativ verändert. Die sauerstoff-

Tabelle VI.

## Muskel : Glykogenzusatz.

| Versuchsanordnung              | cmm O <sub>2</sub> |     | O <sub>2</sub> : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|--------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                |                    |     | gefunden                               |     | theoretisch |     |
|                                | 1                  | 2   | 1                                      | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle                      | 331                | 264 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-8</sup>     | 316                | 280 | 95                                     | 106 |             |     |
| " 1.10 <sup>-7</sup>           | 310                | 302 | 94                                     | 114 |             |     |
| " 1.10 <sup>-6</sup>           | 344                | 306 | 104                                    | 116 |             |     |
| " 1.10 <sup>-5</sup>           | 342                | 296 | 103                                    | 112 |             |     |
| " 1.10 <sup>-4</sup>           | 352                | 320 | 106                                    | 121 |             |     |
| Kontrolle                      | 296                | 380 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-10</sup>  | 280                | 378 | 95                                     | 100 |             |     |
| " + Coffein 1.10 <sup>-8</sup> | 282                | 382 | 95                                     | 100 | 95          | 103 |
| " + " 1.10 <sup>-7</sup>       | 305                | 386 | 103                                    | 102 | 95          | 197 |
| " + " 1.10 <sup>-6</sup>       | 350                | 436 | 117                                    | 115 | 100         | 108 |
| " + " 1.10 <sup>-5</sup>       | 302                | 399 | 102                                    | 105 | 99          | 106 |
| " + " 1.10 <sup>-4</sup>       | 294                | 410 | 99                                     | 108 | 101         | 111 |
| Kontrolle                      | 358                | 358 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-6</sup>   | 340                | 340 | 95                                     | 95  |             |     |
| " + Coffein 1.10 <sup>-8</sup> | 314                | 280 | 88                                     | 78  | 95          | 101 |
| " + " 1.10 <sup>-7</sup>       | 378                | 361 | 106                                    | 101 | 95          | 105 |
| " + " 1.10 <sup>-6</sup>       | 410                | 446 | 115                                    | 125 | 100         | 106 |
| " + " 1.10 <sup>-5</sup>       | 369                | 358 | 103                                    | 100 | 99          | 104 |
| " + " 1.10 <sup>-4</sup>       | 348                | 384 | 97                                     | 107 | 101         | 108 |

verbrauchenden Vorgänge sind also je nach der Gewebsart verschieden. — Aus den Tabellen VII und VIII ist zu entnehmen, daß das Digilanid die Sauerstoffzehrung von Lebergewebe nur geringfügig verändert. Bei starken Verdünnungen beobachten wir eine Hemmung und bei der höchsten Konzentration von 2.10<sup>-6</sup> eine leichte Steigerung in der Leberatmung. Das Coffein ist in unseren Versuchen, abgesehen von einigen Konzentrationen, bei denen die Sauerstoffatmung vermehrt ist, wirkungslos. Man könnte erwarten, daß die beiden Stoffe bei gleichzeitigem Zusatz die Leberatmung gleichfalls unbeeinflusst lassen, da der Einfluß

Tabelle VII.

Leber : ohne Zusatz.

| Versuchsanordnung                 | cmm O <sub>2</sub> |     | O <sub>2</sub> : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|-----------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                   |                    |     | gefunden                               |     | theoretisch |     |
|                                   | 1                  | 2   | 1                                      | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle                         | 473                | 425 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-10</sup>     | 404                | 387 | 85                                     | 91  |             |     |
| " 2.10 <sup>-9</sup>              | 449                | 395 | 95                                     | 93  |             |     |
| " 2.10 <sup>-8</sup>              | 464                | 404 | 98                                     | 95  |             |     |
| " 2.10 <sup>-7</sup>              | 470                | 409 | 99                                     | 96  |             |     |
| " 2.10 <sup>-6</sup>              | 502                | 441 | 106                                    | 104 |             |     |
| Kontrolle                         | 361                | 388 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-7</sup>        | 338                | 360 | 94                                     | 93  |             |     |
| " + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 330                | 340 | 92                                     | 87  | 90          | 92  |
| " + " 2.10 <sup>-9</sup>          | 356                | 384 | 99                                     | 99  | 95          | 93  |
| " + " 2.10 <sup>-8</sup>          | 388                | 398 | 107                                    | 103 | 96          | 94  |
| " + " 2.10 <sup>-7</sup>          | 392                | 402 | 108                                    | 104 | 97          | 95  |
| " + " 2.10 <sup>-6</sup>          | 442                | 429 | 122                                    | 111 | 100         | 99  |
| Kontrolle                         | 362                | 424 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-4</sup>        | 398                | 454 | 110                                    | 107 |             |     |
| " + Digilanid 2.10 <sup>-10</sup> | 352                | 376 | 97                                     | 89  | 98          | 98  |
| " + " 2.10 <sup>-9</sup>          | 400                | 440 | 110                                    | 104 | 103         | 101 |
| " + " 2.10 <sup>-8</sup>          | 432                | 448 | 119                                    | 106 | 105         | 101 |
| " + " 2.10 <sup>-7</sup>          | 416                | 442 | 115                                    | 104 | 105         | 102 |
| " + " 2.10 <sup>-6</sup>          | 468                | 452 | 129                                    | 106 | 108         | 106 |

jeder Verbindung für sich nur eben angedeutet ist. Wie die Versuche zeigen, ist das aber durchaus nicht der Fall. In jedem Falle ergibt sich eine Sauerstoffaufnahme, die größer ist als der Summe der Teilvorgänge entspricht. Die Kombination der Gifte, die die Oxydationsvorgänge der Leber am stärksten anregen, sind 1.10<sup>-7</sup> Coffein und 2.10<sup>-6</sup> Digilanid, 1.10<sup>-4</sup> Coffein + 2.10<sup>-6</sup> Digilanid, 1.10<sup>-6</sup> Coffein + 2.10<sup>-10</sup> Digilanid und 1.10<sup>-6</sup> Coffein + 2.10<sup>-6</sup> Digilanid. Die Ausschläge sind besonders hoch, wenn man hohe Digilanidkonzentrationen mit Coffein zusammenbringt. Am stärksten wirksam ist hier die Coffeinkonzentration von 1.10<sup>-6</sup>

Tabelle VIII.  
Leber : ohne Zusatz.

| Versuchsanordnung              | cmm O <sub>2</sub> |     | O <sub>2</sub> : % vom Kontrollversuch |     |             |     |
|--------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                |                    |     | gefunden                               |     | theoretisch |     |
|                                | 1                  | 2   | 1                                      | 2   | 1           | 2   |
| Kontrolle                      | 285                | 243 | 100                                    | 100 |             |     |
| Coffein 1.10 <sup>-8</sup>     | 278                | 248 | 98                                     | 102 |             |     |
| " 1.10 <sup>-7</sup>           | 282                | 281 | 99                                     | 116 |             |     |
| " 1.10 <sup>-6</sup>           | 302                | 264 | 106                                    | 108 |             |     |
| " 1.10 <sup>-5</sup>           | 278                | 275 | 98                                     | 113 |             |     |
| " 1.10 <sup>-4</sup>           | 314                | 250 | 110                                    | 103 |             |     |
| Kontrolle                      | 318                | 322 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-10</sup>  | 300                | 318 | 94                                     | 99  |             |     |
| " + Coffein 1.10 <sup>-8</sup> | 304                | 300 | 95                                     | 93  | 96          | 101 |
| " + " 1.10 <sup>-7</sup>       | 331                | 334 | 104                                    | 104 | 97          | 108 |
| " + " 1.10 <sup>-6</sup>       | 386                | 386 | 122                                    | 120 | 100         | 104 |
| " + " 1.10 <sup>-5</sup>       | 353                | 370 | 111                                    | 118 | 96          | 106 |
| " + " 1.10 <sup>-4</sup>       | 311                | 310 | 98                                     | 96  | 102         | 101 |
| Kontrolle                      | 352                | 348 | 100                                    | 100 |             |     |
| Digilanid 2.10 <sup>-6</sup>   | 338                | 344 | 96                                     | 99  |             |     |
| " + Coffein 1.10 <sup>-8</sup> | 360                | 356 | 102                                    | 102 | 97          | 101 |
| " + " 1.10 <sup>-7</sup>       | 408                | 403 | 116                                    | 116 | 98          | 108 |
| " + " 1.10 <sup>-6</sup>       | 434                | 418 | 123                                    | 120 | 101         | 104 |
| " + " 1.10 <sup>-5</sup>       | 382                | 398 | 109                                    | 113 | 97          | 106 |
| " + " 1.10 <sup>-4</sup>       | 417                | 406 | 118                                    | 115 | 103         | 101 |

in Verbindung sowohl mit großen wie mit kleinen Digilanidgaben. In Versuch 1 Tabelle VIII hat z. B. Digilanid 2.10<sup>-10</sup> die Sauerstoffaufnahme um 6 % gegenüber dem Kontrollversuch erniedrigt. Die Coffeinkonzentration 1.10<sup>-6</sup> dagegen um 6 % gesteigert. Bei reiner additiver Wirkung hätte die oxydationssteigernde Wirkung des Coffeins die oxydationshemmende Wirkung des Digilanids gerade aufheben müssen. Statt dessen beobachten wir eine Atmungssteigerung um 20 %.

Unsere Versuche zeigen, daß unter der Digilanidwirkung die Oxydationsvorgänge in der Leber durch Zusatz von Coffein sowohl durch niedrige wie hohe Gaben gefördert werden.

Vergleicht man die an Herz, Leber und Muskel gewonnenen Ergebnisse miteinander, so ergibt sich, daß die maximal fördernde Kombination bei den einzelnen Organen verschieden ist. Beim Herzmuskel entsprechen die günstigsten Kombinationen den theoretisch errechneten Dosen der Gifte ( $1 \cdot 10^{-7}$  Coffein und  $2 \cdot 10^{-8}$  Digilanid). Die gleiche Kombination ist an der Leber unwirksam, desgleichen beim Skelettmuskel, während hier nach Glykogenzusatz eine mittlere Atmungssteigerung auftritt.

## Zusammenstellung.

Die gleichzeitige Einwirkung von Digilanid und Coffein auf den Sauerstoffverbrauch überlebenden Gewebes führt nicht zu einer Summierung der Einzelwirkungen. Die Sauerstoffzehrung in den verschiedenen Organen verhält sich nicht einheitlich. Die maximal steigenden Giftkombinationen sind an den einzelnen sauerstoffverbrauchenden Organen verschieden. Beim Glukoseabbau durch Herzmuskel finden wir den stärksten Sauerstoffverbrauch bei der Kombination von Coffein 1.10—<sup>7</sup> + Digilanid 2.10—<sup>8</sup>. Geringe Coffeingaben verstärken die Digilanidwirkung, während hohe Coffeingaben umgekehrt die Digilanidwirkung abschwächen. Die Atmung von Lebergewebe verhält sich anders. Hier wird sowohl durch hohe wie auch durch niedrige Coffeingaben die Digilanidwirkung verstärkt. Das Gleiche gilt für die Sauerstoffatmung von Skelettmuskelgewebe. Die Herzmuskulatur nimmt also unter den Organen hinsichtlich ihrer Giftempfindlichkeit eine Sonderstellung ein.

---

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. W. Haarmann für die Ueberlassung des Themas und für seine Anregungen dazu meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

## Lebenslauf.

Am 12. März 1906 wurde ich als Sohn des Lehrers Anton Meyer zu Langenberg in Westfalen, Kreis Wiedenbrück, geboren. Nach Absolvierung der Volksschule besuchte ich das Gymnasium zu Paderborn und Duderstadt (Eichsfeld), das ich Ostern 1930 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Meine vorklinischen Semester verbrachte ich an der Universität zu Würzburg, wo ich im Sommersemester 1931 das zahnärztliche Vorexamen bestand. Die klinischen Semester studierte ich an der Universität zu Münster in Westfalen und erhielt im Wintersemester 1933—34 die Approbation als Zahnarzt.